物理学概論第一

第 1 回

物理 (Physics) って何？

③

古代ギリシャ語 φύσις, **自然の事物**を表す言葉

フィジカ

古代ギリシャでは,

物理 = 自然科学一般

じゃあ, **自然科学**って何？

↑
→ 人文科学, 社会科学

じゃあ自然科学って何？

④

1. 自然現象をひたすら**観察**
2. 自然現象の中に, 共通性・規則性を**発見**
3. 共通性・規則性を説明する**仮説**を考える
4. 仮説を実験で**検証**

(検証できなければ1からまた始める)

検証に耐え生き残った仮説を**法則**と呼ぶ

ニュートンの運動法則, メンデルの遺伝の法則など

– 自然科学は, 化学, 生物, 地学全てを含む

じゃあ物理学って何？

⑤

1. 自然現象を, 計測できる「物理量」で記述

速度, 加速度, 質量, 力, 仕事, エネルギー,

温度, 電荷, 電流, 電場, 磁場

物理量は必ず計測できる!

2. 物理量の間を数式で表現 → 物理法則

$$ma = F \qquad F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

ニュートンの運動法則, 万有引力の法則,

ガウスの法則, ファラデーの法則

自然現象を

- 説明
- 予測
- 応用

物理学の構成要素

⑥

古典力学, 解析力学, 一般相対性理論, 特殊相対性理論, 電磁気学, 熱力学, 統計力学, 流体力学, 量子力学, 原子物理学, 原子核物理学, 素粒子物理学, 物性物理学, 宇宙物理学, 地球物理学, 応用物理学 ...

適用範囲がある

全ての基本になるのが古典力学

古典力学とは...

7

常識的な条件下での物体の運動を理解する。

速度が光速より十分に遅い, 十分な大きさがある, 巨大質量から十分に遠い

輸送機関, 人工衛星, ロボットなど

使う武器は...

1. 運動の法則 (ニュートンの運動の3法則)
2. 力の法則 (万有引力の法則など)

高校で習ったのと同じじゃない？

ちよつとテスト

昨年の中間試験問題の 1/3 くらいを抜粋。

試験時間は 20 分。自己採点してもらった後で集めます。

意味不明なところがあっても、とりあえず 20 分間は考えてみて。一応テストなので、まわりと相談したりするのは NG

古典力学 - 大学ヴァージョン

⑧

常識的な条件下での物体の運動を理解する。

使う武器は...

1. 運動の法則 (ニュートンの運動の3法則)
2. 力の法則 (万有引力の法則など)

非常に強力な武器

+ 微分・積分 & ベクトルの内積・外積

第 01 回: 力学 ① - 物理量の表現, 単位, 次元

第 02 回: 力学 ② - 質点と運動の表し方

第 03 回: 力学 ③ - 運動の法則

第 04 回: 力学 ④ - 力と運動 I

第 05 回: 力学 ⑤ - 力と運動 II その 1

第 06 回: 力学 ⑥ - 力と運動 II その 2

第 07 回: 力学 ⑦ - 仕事と運動エネルギー

第 08 回: 力学 ⑧ - 保存力とポテンシャルエネルギー

第 09 回: 力学 ⑨ - エネルギー保存則

- 計測できるものを物理量と呼ぶ

計測できないものは物理量ではない!

- 全ての物理量には**単位**がある

物理量は“ある基準量の何倍か”でしか計測できない!

- 必ず「**数値**」×「**単位**」という形で表現する

じゃあどんな単位を使えば良いのか?

- 物理量の積（商）

数値は数値同士で積を取り、

単位は単位同士で積を取る

$$10 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 =$$

$$10 \text{ cm} \times 2 \text{ m} =$$

- 物理量の積（商）

数値は数値同士で積を取り、
単位は単位同士で積を取る

$$10 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 = 100 \text{ kg m/s}^2$$

$$10 \text{ cm} \times 2 \text{ m} = 20 \text{ cm m} = 0.1 \text{ m} \times 2 \text{ m} = 0.2 \text{ m}^2$$

間違いじゃないけど...

- 物理量の和

単位を揃えて数値を足したり引いたり

(単位を揃えられない場合は和は取れない)

$$1.23 \text{ m} + 10 \text{ cm} =$$

$$1.23 \text{ kg} + 300 \text{ g} =$$

$$1.23 \text{ kg m/s}^2 + 3000 \text{ g cm/s}^2 =$$

- 物理量の和

単位を揃えて数値を足したり引いたり

(単位を揃えられない場合は和は取れない)

$$1.23 \text{ m} + 10 \text{ cm} = 1.23 \text{ m} + 0.10 \text{ m} = 1.33 \text{ m}$$

$$1.23 \text{ kg} + 300 \text{ g} = 1.23 \text{ kg} + 0.300 \text{ kg} = 1.53 \text{ kg}$$

$$\begin{aligned} 1.23 \text{ kg m/s}^2 + 3000 \text{ g cm/s}^2 &= 1.23 \text{ kg m/s}^2 + 0.03 \text{ kg m/s}^2 \\ &= 1.26 \text{ kg m/s}^2 \end{aligned}$$

単位の積 → 組立単位

15

基本単位以外の物理量の単位は、定義や物理法則を使って、基本単位から**組み立てる**。

速度: 距離 ÷ 時間 → m/s
加速度: 速度 ÷ 時間 → m/s²] 速度・加速度の定義に基づいて組み立てている

力: 質量 × 加速度 → kg m/s² (= N)

↑
運動方程式 “ $ma=F$ ” に基づいて組み立てている

固有の名称を持つ SI 組立単位 ①6

幾つかの SI 組立単位には固有の名前がある

量	単位	単位記号	SI 基本単位 による表現	他の SI 単位 による表現
力	ニュートン	N	運動方程式 kg m s^{-2}	J/m
<small>単位面積あたりの力</small> 圧力	パスカル	Pa	$\text{kg m}^{-1}\text{s}^{-2}$	<small>定義</small> N/m^2
仕事	ジュール	J	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$	<small>定義</small> N m

次元 (ディメンジョン)

17

ある物理量の単位が $m^a kg^b s^c$ であるとする。

このとき、以下をこの物理量の次元という。

$$\begin{array}{ccc} \text{長さ} & & \text{時間} \\ [L^a M^b T^c] & & \\ & \text{質量} & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{kg} & \text{m/s}^2 & \\ \swarrow & \searrow & \downarrow \\ [L & M & T^{-2}] \end{array}$$

物理量の間関係式では、両辺の次元は必ず等しくなる。両辺の次元が同じかを調べ、計算過程・結果の正しさを確認することが可能。

次元 (ディメンジョン)

18

例) 長さ l の糸におもりを吊した振り子の周期は以下で与えられる. 物理量 g の次元は?

周期

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

重力加速度

次元 (ディメンジョン)

18

例) 長さ l の糸におもりを吊した振り子の周期は以下で与えられる. 物理量 g の次元は?

周期

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

重力加速度

$$\Leftrightarrow g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$$

g の次元は

$$[LT^{-2}]$$

加速度の次元